

микрокапсулированное инсектицидное  
средство  
**хлорпирифос 25% + синергисты, МС**

# ДОБРОХИМ

## микро

**предназначен** для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров и ос.

Обладает контактным и кишечным действием. Исключительно сильное и продолжительное последствие (до 6 месяцев) устраняет возможность нового появления бытовых насекомых, а также необходимость повторной обработки помещений. Микрокапсуляция в полимерные капсулы гарантирует сохранение высокой активности препарата в самых сложных условиях включая, высокие температуры, прямой солнечный свет, высокую влажность. Это очень важно для обработки помещений по периметру и при обработке труднодоступных мест. Основным достоинством является меньшая степень его опасности для теплокровных за счет того, что ДВ спрятано в полимерную микрокапсулу, а в качестве растворителя использованы не органические соединения, а вода. Не вызывает раздражения, не повреждает обработанные поверхности, не оставляет видимых следов обработки, не имеет неприятного запаха.

Разрешено для применения населением в быту.

### ПРИМЕНЕНИЕ

**уничтожение бытовых насекомых:** рабочую эмульсию нанести из распылителя на поверхности в местах обнаружения, перемещения или выплода насекомых (вент. короба, антресоли, плитуса, дверные и оконные короба, места прокладки труб водо- и теплоснабжения, пол, наружные и внутренние стены строений, мусорные камеры, выгребные ямы и пр.)

**приготовление рабочей эмульсии для борьбы с бытовыми насекомыми (на 1 л воды):**

Объект обработки	Кол-во препарата
тараканы, осы	10,0 мл
мухи личинки	8,0 мл
муравьи, мухи имаго	6,0 мл
клопы, блохи, комары имаго	4,0 мл
комары личинки	3,0 мл

### меры предосторожности:

обработку проводить при открытых окнах, используя средства индивидуальной защиты (очки, респиратор, халат или комбинезон, косынка, клеенчатый или прорезиненный фартук, и перчатки, резиновые перчатки). На время проведения обработки убрать (тщательно укрыть) продукты питания и пищевую посуду, удалить из помещения животных, птиц, закрыть аквариумы. Лекарственные препараты и инструменты убрать в шкаф. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работ принять душ и проветрить помещение (не менее 30 мин). Спецодежду снять и проветрить.

- при попадании средства в глаза – тщательно промыть их водой. При появлении раздражения слизистой оболочки – закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности – 2% раствор новокаина;

- при загрязнении кожи – снять капли эмульсии ватным тампоном, не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом;

- при случайном попадании средства в желудок – необходимо выпить 1-2 стакана воды с измельченным активированным углем (10-15 таб. на стакан воды). Не вызывать рвоту и ничего не вводить в рот человеку, потерявшему сознание. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу.

### III класс умеренно опасных веществ.

### хранение:

хранить средство следует в сухом закрытом прохладном складском помещении в закрытой упаковке, при температуре не ниже -5°C и не выше +40°C, вдали от источников огня и солнечного света, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов в недоступном для детей месте.

Срок годности - 5лет

## период защитного действия до 6 месяцев

ТУ 9392-004-84383621-2011

Свидетельство гос. регистрации:

№ RU.77.99.01.002.Е.034108.08.11 от 26.08.2011г.

Регистрант: ООО "Доброхим" Россия, МО

Производство: ООО "Доброхим"

140117, МО, Раменский р-он, с. Загорново